みんなの健康ラジオ

『痔核(いぼ痔)、裂肛(切れ痔)の実際』 (2022年5月26日放送) 横浜外科医会 (医)恵仁会松島医院 宮島 伸宜

痔核(いぼ痔)・裂肛(切れ痔)の診断と治療

- 痔核(いぼ痔)とは
 - ・痔核の原因
 - 痔核の症状
 - 痔核の治療
- 裂肛(切れ痔)とは
 - ・ 裂肛の原因
 - ・ 裂肛の症状
 - ・ 裂肛の治療

痔核の原因、症状

- 日本人の21.6-55%が痔核を持つといわれる
- リスク因子
 - 慢性の便秘
 - 重いものを持つ、長時間座りっぱなし
 - 食物繊維の摂取不足
 - アルコール
 - 妊娠、出産など
- 症状
 - 出血(排便時に紙につく、便器が赤くなる)
 - 痛み(排便時の痛み)
 - 脱出


痔核の治療

- 生活習慣のコントロール
 - 排便、食事、仕事内容ど
- 薬物療法
 - 軟膏、坐薬
 - 排便調節
- 硬化療法
 - 局所に注射をおこなって出血などのコントロールを行う(再発率 は高い)
- 手術療法
 - 結紮切除術



裂肛の原因と症状

- 11.1%の発生率
- 原因
 - 便秘
 - 強いいきみ
 - 過度な下痢
- 症状
 - 排便時の痛み
 - 少量の出血
 - 悪化すると肛門が狭くなり、排便困難



裂肛の治療

- 排便習慣のコントロール
 - 便秘、下痢を避ける
 - 食事、水分のコントロール
- 保存療法
 - 軟膏、坐薬
 - 食物繊維の摂取と温坐浴
- 手術療法
 - 括約筋切開術
 - 裂肛切除術
 - 肛門形成術
 - 肛門拡張術