脂肪肝より怖い！？ 霜降り筋肉ってなに？

新横浜かとうクリニック 院長 加藤 洋一

余った脂肪の行き先

余剰脂肪

1. 幼児期までは脂肪は皮下に貯まります（脂肪球数が決まる）
2. それ以降、内臓に脂肪が貯まります
3. 放っておくと筋肉に脂肪が貯まります。
4. 様々な病気になります

適正な
体脂肪率

長生きには
脂肪も必要

体脂肪率と寿命の関係（数値まとめ）

性別 最も長寿な
体脂肪率

男性 25%

女性 32%

死亡リスクが上昇する体脂肪率

20%未満：死亡リスク1.6倍

25%未満：死亡リスク1.5倍

痩せていると死にやすい

痩せていると筋肉が少なく 死にやすい

痩せると

サルコペニアとロ
コモティブ症候群
転倒・骨折・寝
たきり

サルコペニア ロコモティブ 症候群

サルコペニアは
死亡リスクが
1.8倍高い

ロコモ3度は
死亡リスクが
1.6倍高い

両方あると
死亡リスクが
2.7倍高い

サルコペニア：加齢で筋肉量や筋力が低下し、身体機能が衰える状態。

ロコモティブ症候群：骨・関節・筋肉の障害で移動機能が低下する状態。

サルコペニアと
ロコモティブ症
候群

骨折・寝たきり

入院して筋肉が落ちると
死亡リスクが高くなる

そのまま寝た切りの老人

骨折の予防には腰椎骨密度を測定しながら、治療をすることが重要です

骨粗鬆症

腰椎圧迫骨折
が怖い

腰椎の骨密度
測定が重要

Tスコア

推奨される介入

≤ -2.5

薬物治療（ビスホスホネート、デノスマブ、テリパラチドなど）を考慮

$-2.0 \sim -2.5$

FRAXや既往歴をふまえて予防策検討

≥ -1.0

維持的な運動・栄養管理が基本

健康診断 腰椎骨密度DEXA検査 一例 8,800円 (リンクス大倉山クリニック)

高齢者は太ると歩けなくなる

歩けいないと筋肉が脂肪化して病気になる

太ると寿命が伸びる？

性別	最も長寿な体脂肪率
男性	25%
女性	32%

高齢者は、皮下脂肪が多くても寿命が縮まらない

内臓脂肪

脂肪肝

霜降り筋肉

脂肪肝を 放っておくと

疾患名	リスク上昇度	出典・備考
肝硬変	約10～20%が進行	NASH患者
肝がん	約2～3%/年	肝硬変から
2型糖尿病	2.2～3.6倍	Diabetes Care 2018
心筋梗塞・脳卒中	約1.6倍	Hepatology 2016
全死亡率	1.3～2倍	長期追跡研究

内臓脂肪と大腰筋CT検査 6,600円(リンクス大倉山クリニック)

氏名 加藤 洋一 様

生年月日 1966/08/14

患者番号 00000036

年齢・性別 58歳・男性

受付番号 13

平素より当院をご利用いただきありがとうございます。

大腰筋検査の結果をご通知申し上げます。

体脂肪解析

大腰筋解析

▲
腹側

▼
背側

青が皮下脂肪 赤が内臓脂肪 緑・桃が起立筋、青・黄が大腰筋

霜降り筋肉
を調べる

健康診断で
わかる
余剰脂肪

大腰筋検査
でわかること

項目	カットオフ値 の例 (SMI)	関連リスク
骨格筋指数 (SMI)	男<52.4/女 <38.5	サルコペニア、死亡率1.6倍↑
大腰筋面積 (L ₃)	<500 mm ²	フレイル、転倒、術後リスク ↑死亡リスク2.0倍
大腰筋放射状 密度 (HU)	<30 HU	霜降り筋肉

霜降り筋肉の 症状

握力で
筋力低下が
ある程度
わかる

①筋力の低下

②バランス能
力の低下

③持久力の低下

④反応の鈍化

握力	サルコペニア	霜降り筋肉
男性	28 k g 未満	21 k g 未満
女性	18 k g 未満	14 k g 未満

霜降り筋肉が 起こすトラブル

転倒・骨折・糖尿
病のリスク・代謝の
低下に加えて脳と
心臓にも悪い

- 米国Framingham Heart Studyによると：
筋肉内脂肪が多い群は、**心筋梗塞**や**心不全の発症リス
クが約2倍**
- 高齢者における心不全発症リスクの上昇
Health ABC Study **心不全発症率が最大1.9倍**
- 筋肉内脂肪と脳卒中リスク
Atherosclerosis Risk in Communities (ARIC) Study
脳卒中のリスクが1.7倍に上昇

霜降り筋肉が 起こすトラブル

転倒・骨折・糖尿病の
リスク・代謝の低下に加え
て脳と心臓にも悪い

心筋梗塞・脳卒中・糖尿病悪化・骨折・寝た切り

こんな方は 霜降り筋肉

・階段を避けがち

・歩幅が短くなってきた

・片足立ちが10秒できない

・手足が細くてぽっこりお腹の人

B M I 25%以上

霜降り筋肉予防筋トレと有酸素運動の両方

スクワット
30回 x 3 /日

ウォーキング
30分 /日

片足立ち
30秒 x 3セット /日

大腿四頭筋ストレッチ
30回/日

使っていない筋肉は刺激しないと動かない

サルコペニア
であれば
リハビリ
も必要

運動不足の筋肉
筋肉が固い

細い筋肉

健康な筋肉

運動不足の筋肉は 運動しても筋肉がなかなかつかない

食事でも筋肉は変わる

- 肉・魚・卵・大豆製品・乳製品などを1日3食に分けて摂る
- 体重1kgあたり1.2~1.5gのたんぱく質摂取
- ビタミンDやビタミンB群の補給も重要です。筋肉代謝や神経機能の維持に関わっており、魚類やキノコ類、緑黄色野菜から摂取できます。

食事も
大切

おいしいものも食べるのも大切

病院に通っていないから健康ではない

高齢者が健康に
過ごすには健康
診断とその結果
で治療して、リ
ハビリして、ト
レーニングして、
ご褒美を食べる
ことが大切

リンクス大倉山

港北総合庁舎前

リンクス大倉山クリニック
内科・整形外科・リハビリ科

大きな病気にならない体作りを推奨

まとめ

太りすぎ
痩せすぎ
運動不足
は寿命を縮める

内臓脂肪と霜降り筋肉（脂肪内筋肉）は、「見えない場所で起きている代謝障害」として互いに関係し合いながら進行します。

この2つを同時に予防・改善することは、生活習慣病の予防や健康寿命の延伸に直結します。

単に体重や見た目にとらわれず、“**筋肉の質**”と“**脂肪の質と分布**”に着目した**健康管理**が今後ますます重要になります。